© Het Oogziekenhuis Rotterdam, juli 2025

Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam
T +31 (0)10 401 77 77
www.oogziekenhuis.nl

Floppy eyelid syndroom

Het floppy eyelid syndroom is een zeldzame aandoening. De afwijking wordt hier toch beschreven omdat patiënten met deze aandoening vaak al jaren klachten hebben voordat de diagnose gesteld wordt. De afwijking komt in verreweg de meeste gevallen (maar niet uitsluitend!) voor bij middelbare te zware mannen.

De klachten bestaan uit chronische irritatie en een zandgevoel aan één of beide ogen. Soms draait het bovenooglid ‘s nachts spontaan naar buiten. Bij onderzoek bestaat er een zeer slap bovenooglid.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de aandoening is niet bekend. Mogelijk bestaat er een algemene afwijking van het bindweefsel die de verslapping van het ooglid veroorzaakt.

Behandeling

Floppy Eyelid Syndroom kan behandeld worden met het dichtplakken van het oog gedurende de nacht en het gebruik van kunsttranen of oogzalf. Meestal is het echter effectiever om het bovenooglid - en eventueel ook het onderooglid - strakker te zetten door er een stukje tussenuit te halen en de randen weer te hechten. Deze operaties zijn niet zeer ingrijpend, ze kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Door de ingreep verminderen de klachten, meestal verdwijnen ze helemaal.

Meer info

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met planning OCPL via het telefoonnummer: 010 402 3310.
De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur.

De informatie in deze folder kunt u terugvinden op www.oogziekenhuis.nl.